


Prezado cliente

- ESTAR COM 8 HORAS DE JEJUM ADULTOS E CRIANÇAS;
- PACIENTES DIABÉTICOS APENAS SUSPENDER A MEDICAÇÃO DURANTE O JEJUM;
- PACIENTES HIPERTENSOS (PRESSÃO ALTA) TOMAR MEDICAÇÃO COM O MÍNIMO DE ÁGUA;
- PACIENTES EM USO DE MOUNJARO, SUSPENDER A MEDICAÇÃO 15 DIAS ANTES DO EXAME.

Importante

- Não interromper o uso sem orientação médica.
 - Caso o paciente utilize a medicação para controle de diabetes, manter monitoramento glicêmico regular durante o período de suspensão.
 - Se o paciente tiver dúvidas sobre segurança da suspensão, consultar seu médico assistente.
 - NÃO VIR DE ESMALTE;
 - NÃO ESTAR GRIPADO, COM TOSSE OU CORIZA;
 - RETIRAR PRÓTESE DENTÁRIA, JOAIS E ADORNOS E ENTREGAR A FAMÍLIA;
 - PACIENTES ACIMA DE 50 ANOS TRAZER ELETROCARDIOGRAMA OU ECOCARDIOGRAMA COM VALIDADE DE 6 MESES, CASO NÃO TENHA NENHUM DOS DOIS EXAMES, TRAZER UMA CARTA DO CARDIOLOGISTA AUTORIZANDO A SEDAÇÃO.
 - VIR ACOMPANHADO (ACOMPANHANTE ACIMA 18 ANOS)
 - NÃO FAZER INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 12 HORAS ANTES DO EXAME
 - NÃO DIRIGIR E NÃO EXERCER ATIVIDADES QUE EXIJAM ATENÇÃO APÓS O EXAME
 - NÃO VIR PILOTANDO OU DE GARUPE EM MOTO (O EXAME PODERÁ SER CANCELADO)
 - COMENTAR QUAISQUER RELATO REFERENTE AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE AO MÉDICO ANESTESISTA NO DIA DO EXAME.
-

	PREPARO RM DE PELVE ENDOMETRIOSE COM SEDAÇÃO	106 1
---	--	----------------------------

SÓ PODERARÃO SER SEDADOS APÓS AVALIAÇÃO DO MÉDICO OS PACIENTES:


- COM HIPERTIREOIDISMO NÃO TRATADO
- USUÁRIOS DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS, COMPOSTOS FENOTIAZÍNICOS
- USUÁRIOS DE COCAÍNA E "CRACK"

NÃO PODERÃO SER SEDADOS

- PACIENTES QUE ESTIVEREM RESFRIADOS, COM FEBRE, DISPNEIA, HIPERTENSÃO, HIPOTENSÃO
- PACIENTES COM DOENÇAS ORGÂNICAS: PRESSÃO ALTA NÃO TRATADA OU NÃO CONTROLADA
- PACIENTES COM DOENÇAS CARDÍACAS GRAVES
- PACIENTES COM DIABETES NÃO CONTROLADA

PREPARO DIA ANTERIOR AO DO EXAME :**DIETA POBRE EM RESÍDUOS DURANTE TODO O DIA:**

- IOGURTES (SEM PEDAÇOS DE FRUTAS);
- PÃO COM POUCA FIBRA;
- BOLACHA DE ÁGUA E SAL;
- BISCOITO POLVILHO;
- SOPA MAGRA COADA (SEM SÓLIDOS) DE CALDO DE CARNE, FRANGO OU DE LEGUMES;
- MACARRÃO COM MOLHO VERMELHO OU ALHO E ÓLEO;
- QUEIJO (BRANCO, MUSSARELA, REQUEIJÃO, COTTAGE);
- GELEIA DE MOCOTÓ;
- GELATINA;
- OVO COZIDO;
- LEITE;
- PURÉ DE BATATA;
- ARROZ BRANCO;
- LÍQUIDOS PERMITIDOS (ATÉ O MOMENTO DO EXAME);
- SUCO DE FRUTAS COADO
- ÁGUA;
- CHÁ;
- CAFÉ;
- ÁGUA DE COCO
- ISOTÔNICOS (EX: GATORADE).

	PREPARO RM DE Pelve Endometriose com Sedação	106 1
---	--	----------

É PROIBIDO: VERDURAS CRUAS, BAGAÇO DE FRUTAS, SALADA DE FOLHAS, FRITURAS, FEIJÕES, GRÃO-DE BICO, MILHO, LENTILHA, ERVILHA, SEMENTES E SIMILARES, LEGUMINOSAS, CEREAIS, ALIMENTOS INTEGRAIS.


MEDICAÇÕES (NO DIA ANTERIOR AO EXAME):

- TOMAR 12 GOTAS DE GUTALAX® ÀS 8 HORAS E ÀS 14 HORAS.
- CASO O MEDICAMENTO CAUSE CÔLICA ABDOMINAL PODE-SE USAR BUSCOPAN® SIMPLES, ORAL (UM COMPRIMIDO OU 30 GOTAS).
- SUSPENDER MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS QUE CONTENHAM FERRO 1 SEMANA ANTES DO SEU EXAME.

NO DIA DO EXAME :

- DIETA POBRE EM RESÍDUOS ATÉ 8 HORAS ANTES DO EXAME
- CASO SEU EXAME SEJA PELA MANHÃ: UTILIZAR O **SUPOSITÓRIO DE GLICERINA** ATÉ 2 HORAS ANTES DO EXAME.
- CASO SEU EXAME SEJA À TARDE/NOITE: UTILIZAR 1 **SUPOSITÓRIO** ANTES DE DORMIR E OUTRO ATÉ 2 HORAS ANTES DO EXAME.

IMPORTANTE: O supositório de glicerina é utilizado para promover a limpeza intestinal, podendo causar urgência de evacuação. Solicitamos que você esteja atento ao seu deslocamento até a clínica, a fim de evitar desconfortos indesejados durante o trajeto.

	PREPARO RM DE PELVE ENDOMETRIOSE COM SEDAÇÃO	106 1
---	--	----------

TRAZER NO DIA DO EXAME:

Exames anteriores;

RG;

CPF;

Carteira do convênio, pedido médico assinado, carimbado e sem rasuras;

Planos que necessitam de autorização prévia, trazer guia autorizada e válida na data do exame;

Chegar 30 minutos antes.