Prezado Cliente

Preparo para realização deste exame com contraste

- 2 horas de jejum total;
- Chegar 30 minutos de antecedência;
- Pacientes que apresentem idade acima de 60 anos, diabetes, hipertensão, cirurgia renal ou que realizem hemodiálise trazer exame de creatinina com validade de 3 meses.

ATENÇÃO MULHERES: VERIFICAR DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO, POIS É PROIBIDO A REALIZAÇÃO DESTE EXAME ESTANDO GESTANTE OU COM SUSPEITA, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO MÉDICA POR ESCRITO. CASO MENSTRUAÇÃO ESTEJA ATRASADA TRAZER EXAME DE BETA HCG (NÃO ACEITAMOS TESTE DE FARMÁCIA).

No dia do exame trazer:

- RG e CPF;
- Carteira do convênio;
- Pedido médico assinado, carimbado e sem rasuras;
- Guia de autorização (para planos que exigem autorização prévia).

ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES ALÉRGICOS

- Pacientes com DPOC, enfisema ou asma devem realizar preparo antialérgico conforme orientação médica.
- Pacientes que utilizam bombinha devem trazê-la no dia do exame caso necessite após o procedimento.
- Pacientes com crise asmática recente (menos de 2 semanas) devem realizar o exame em ambiente hospitalar.
- Paciente alérgico a IODO sem reação grave, realizar kit antialérgico antes do exame.
- Pacientes com histórico de reação grave (edema de glote, choque anafilático, parada cardiorrespiratória, entre outros) não devem receber contraste na clínica. Nesses casos, o exame deve ser realizado em ambiente hospitalar, com a devida orientação sobre os riscos.

Observação

- Pacientes que for diabético e precisar fazer uso do kit ante antialérgico pegar A CARTA do médico com autorização para realizar o uso dos medicamentos (Prednisona 20mg e Allegra 180mg) já que o mesmo pode ocorrer uma alteração em sua glicemia.
- Pacientes com hipertireoidismo trazer exames de T4 e TSH. (Validade de 30 dias) e observar se está dentro do padrão limite.
- Em caso de Dúvidas sobre reações alérgicas ligar no setor de Tomografia.

O setor de Tomografia irá entrar em contato um dia antes da data do exame agendado para reorientar todos os cuidados pré exame de Tomografia com contraste, só no caso de pacientes que sinalizar algum tipo de alergia.