

	PREPARO RM Pelve com e sem contraste	066 3
---	--------------------------------------	----------


PREZADO CLIENTE

PREPARO PARA REALIZAÇÃO DESTE EXAME COM CONTRASTE:

- 2 horas de jejum;
- Vir com roupa de ginástica (sem metal, zíper e botões).
- Não comparecer para o exame com cabelo molhado.
- Chegar com 30 minutos de antecedência.
- Em caso de problemas renais trazer exame de creatinina recente (até 3 meses).
- Pacientes do sexo feminino: no momento da realização do exame, será necessário aplicação do gel vaginal. Não podendo estar menstruada para a aplicação do gel.
- Esse exame não pode ser realizado em pacientes com suspeita de gestação. Em caso de atraso menstrual descartar a possibilidade de gestação trazendo o exame de Beta HCG.

ATENÇÃO MULHERES: VERIFICAR DATA DA ÚLTIMA MENSTRUÇÃO, POIS É PROIBIDO A REALIZAÇÃO DESTE EXAME ESTANDO GESTANTE OU COM SUSPEITA, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO MÉDICA POR ESCRITO. CASO MENSTRUÇÃO ESTEJA ATRASADA TRAZER EXAME DE BETA HCG (NÃO ACEITAMOS TESTE DE FARMÁCIA).

Obs: No caso de algum tipo de sangramento entrar em contato com o médico solicitante para verificar a possibilidade de realizar o exame.



Dr. Luis Augusto Gasparini CRM: 74981

Elaborado por: Nancy Y. N. Gasparini	Data da criação: 28/03/2022
Revisado por: Luciana Nascimento Amorim	Revisado em: 30/08/2024
Aprovado por: Luis Augusto Gasparini	Aprovado em: 02/09/2024

PREPARO INTESTTINAL PARA MULHERES - (SOMENTE SE MÉDICO SOLICITAR NO PEDIDO PREPARO INTESTINAL OU SE NO PEDIDO ESTIVER SOLICITANDO GEL ANAL/RETAL)

Na véspera do exame:

- Durante todo o dia, é necessário manter uma dieta pobre em resíduos, sem gorduras, composta com bastante fibra, frutas, verduras e legumes;
- Tomar às 12horas 30 gotas de Dulcolax®, ou 3 comprimidos de Dulcolax®;
- E tomar às 22horas 30 gotas de Dulcolax®, ou 3 comprimidos de Dulcolax®;
- Necessário jejum de 4 horas, inclusive de água.



Dr. Luís Augusto Gasparini CRM: 74981

Obs.: Apresentando qualquer alteração com o uso das medicações, suspender o uso imediatamente, entrar em contato com a Clínica e/ou procurar pronto atendimento.