

|                                                                                   |                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|  | Preparo Tomografia bacia com ou sem contraste | 091<br>2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|

Prezado Cliente

**Preparo para realização deste exame com contraste**

- 2 horas de jejum total;
- Chegar 30 minutos de antecedência;
- Trazer exame de BETA HCG caso menstruação esteja atrasada;

**ATENÇÃO MULHERES: VERIFICAR DATA DA ÚLTIMA MENSTRUÇÃO, POIS É PROIBIDO A REALIZAÇÃO DESTE EXAME ESTANDO GESTANTE OU COM SUSPEITA, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO MÉDICA POR ESCRITO.**

**No dia do exame trazer:**

- RG;
- CPF;
- Carteira do convênio;
- Pedido médico assinado, carimbado e sem rasuras;
- Planos que necessitam de autorização prévia, trazer guia autorizada e válida na data do exame;

**ORIENTAÇÃO PARA PACIENTES ALÉRGICOS, QUE FOREM REALIZAR TOMOGRAFIA COM CONTRASTE**

- o Paciente portador de DPOC, enfisema e asma necessitam de preparo antialérgico.
- o Paciente que fazem uso de bombinha deve trazê-la caso necessite após o procedimento.
- o Paciente asmático com crise recente em menos de 2 semanas, realizar contraste em ambiente hospitalar.
- o Paciente alérgico a IODO sem reação grave, realizar kit antialérgico antes do exame.
- o Em pacientes alérgicos a IODO ou a medicamentos e crustáceos com histórico de reação grave como edema de glote, choque anafilático, PCR e etc., não deve ser administrado o contraste. Neste caso o paciente deve ser esclarecido sobre os riscos da administração do contraste e orientar o paciente a
- realizar seu exame em ambiente hospitalar.

**Observação**

- Pacientes que for diabético e precisar fazer uso do kit ante antialérgico pegar A CARTA do médico com autorização para realizar o uso dos medicamentos (Prednisona 20mg e Allegra 180mg) já que o mesmo pode ocorrer uma alteração em sua glicemia.
- Pacientes com idade acima de 60 anos, com hipertensão, Diabetes, cirurgia renal e que façam hemodiálise fazer exame de creatinina e ligar na clínica um dia antes para o setor de tomografia e informar ao profissional de plantão para que seja realizado o cálculo do clearance de creatinina. (Exame de Creatinina validade de 3 mês).
- Pacientes com hipertireoidismo trazer exames de T4 e TSH. (Validade de 1 mês) e observar se está dentro do padrão limite.
- Em caso de Dúvidas sobre reações alérgicas ligar no setor de Tomografia.

O setor de Tomografia irá entrar em contato um dia antes da data do exame agendado para reorientar todos os cuidados pré exame de Tomografia com contraste, só no caso de pacientes que sinalizar algum tipo de alergia.

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Elaborado por: Nancy Y. N. Gasparini    | Data da criação: 28/03/2022 |
| Revisado por: Luciana Nascimento Amorim | Revisado em: 11/12/2024     |
| Aprovado por: Luís Augusto Gasparini    | Aprovado em: 11/12/2024     |